




НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В РОССИИ

с середины XX века



Институт демографии


ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В РОССИИ С СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА»

Научный редактор и руководитель
авторского коллектива А.Г. Вишневский,
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017, 447 стр.

Москва, 2018

СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Распределение умерших в России по причинам смерти, 2000-2016



■ Новообразования


■ Болезни системы кровообращения

■ Внешние причины

■ Остальные причины


СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Вклад смертности от разных классов причин смерти в отставание по продолжительности жизни от ЕС-15 в 2010 году, лет




СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Возрастное распределение табличных чисел умирающих (d_x) от новообразований и от внешних причин, мужчины



СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН


Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин в России и в ЕС-15, на 100 000



СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Общий обзор

- Лидирующая позиция - смертность от повреждений с неопределенными намерениями (ПНН).
- Совокупная доля смертей от ПНН, убийств и самоубийств показывает рост. У мужчин эта доля увеличилась в 1960-2016 гг. с 28% до 47%.
- «Горб травматической смертности» - наибольшее число смертей у мужчин в возрасте 20-24 года, у женщин – 15-19 лет.
- В трудоспособных возрастах внешние причины смерти наравне с болезнями системы кровообращения определяют изменения в продолжительности жизни.



Структура внешних причин смерти в России, 1956-2014, %


УБИЙСТВА

Региональное сравнение

- Северо-восточный градиент, характерный для различных причин смертей.
- В возрастной группе от 45 до 59 лет наблюдается 140-кратное различие показателей мужской и 55-кратное различие женской смертности от убийства.

Факторы


Возрастная структура, урбанизация и плотность населения, неравенство, этноязыковая и религиозная неоднородность, злоупотребление алкоголем.



Стандартизованный коэффициент смертности от убийств в России в целом и в четырех кластерах регионов, 1992–2010 гг.

САМОУБИЙСТВА

Несмотря на снижение, уровень суицидальной смертности в России по-прежнему остается высоким, особенно на фоне европейских стран, США и Японии



- С 1956 по 2014 г. в России в результате самоубийств погибло более 2 млн. 344 тыс. чел.
- Уровень смертности от самоубийств у мужчин в 5 раз выше чем у женщин
- Наибольшему риску умереть от самоубийств подвержены люди в трудоспособных возрастах
- Большинство самоубийств совершается весной и летом
- В России отсутствуют меры по профилактике самоубийств среди групп населения с наиболее высоким уровнем суицидальной смертности, таких как сельские мужчины и женщины



АВАРИИ НА ДОРОГАХ РОССИИ

Кто виноват и что делать?

- В России с 1956 по 2017 год в ДТП погибло более 1,5 млн. человек.
- Уровень автомобилизации России на начало 2017 года еще не достиг показателя 300 автомобилей на 1000 населения.
- В России несмотря на положительные тенденции последних лет, сохраняется значительное отставание в уровне смертности от стран лидеров в области БДД.


Вопросы на которые отвечает глава о ДТП:

- В чем причины отставания России от европейских стран?
- Виноваты ли дураки и дороги?
- Эффективны ли меры политики, применяемые в России?
- Может ли России помочь международный опыт?
- Какое будущее нас ждет?

ПОТЕРИ ОТ СМЕРТНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН: ПРИМЕР ДТП

- Потери от травматизма в результате воздействия внешних причин не менее важны чем потери в результате смертности
- Необходимо наладить систематическое изучение потерь от травматизма в результате внешних причин, в частности ДТП – крупнейшей из категории «внешние причины смерти»
- Какие показатели нужны для этого?
- Какие источники позволяют получить эту информацию?
- Почему выбраны ДТП?


ТРАВМАТИЗМ В РОССИИ В СРЕДНЕМ С 2006 ПО 2011 ГГ. - ДТП







СЛУЧАЙНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ

Особое место в структуре смертности населения России - случайные отравления алкоголем (СОА).




Вклад смертности от случайных отравлений алкоголем и от убийств в стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин, 1956-2016 гг., %

По сравнению с развитыми странами уровень данной причины смерти - чрезвычайно высок.



Стандартизованные коэффициенты смертности от случайных отравлений алкоголем в России и отобранных странах, 2000-2015 гг., на 100000

Стандартизованный коэффициент смертности от случайных отравлений алкоголем, на 100000 (левая ось) и потребление алкогольных напитков, л/на душу населения, по разным оценкам (правая ось), 1956-2015 гг.




Потребление регистрируемого алкоголя в 1985 г. по сравнению с 1984 г. упало: по данным Росстата на 16%, в 1986 г. – на 51%, в 1987 г. – на 63%; по оценкам А.В. Немцова - на 9%, 26% и 25%.

После 1987 г. - рост потребления: в 1988 г. на 13%, 1989 г. на 36%, в 1990 г. на 43%. В 1994 г. - на 74% выше, чем в 1987 г., а СКС от СОА для обоих полов в 1994 г. (37,8 на 100000) был в 2 раза выше, чем в 1984 г.

Потребление алкоголя в начале 1990-х гг. было ниже, чем в 1980-х гг., а уровень смертности в 2 раза выше (увеличение доли в населении «тяжелых» потребителей алкоголя за счет сохранивших жизнь во время антиалкогольной кампании).

Колебания продолжительности жизни (лет) и стандартизованного коэффициента смертности от случайных отравлений алкоголем (на 100000), Россия 1959-2015 гг.



Две кривые зеркально отображаются на протяжении более полувека, причем это характерно и для мужчин, и для женщин



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.hse.ru/demo/

Телефон.: +7(495) 772-9590 доб. 11823

Адрес: Б. Трехсвятительский пер., д.3, 403